



Impfung gegen die pandemische Grippe (H1N1) 2009

Wer sollte sich impfen lassen?

- Generell wird die Impfung gegen die pandemische Grippe (H1N1) 2009 allen Personen (ab 6 Monaten) empfohlen, die sich und ihre Umgebung vor der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 und ihren Komplikationen schützen wollen.
- Schwangere werden von einem internen Gynäkologen betreut.
- In der Spital STSAG werden Personen ab 7 Jahren geimpft. Kinder unter 7 Jahren sollen sich durch den Haus- resp. Kinderarzt behandeln lassen.

Wem ist die Impfung nicht zu empfehlen?

- Säuglingen unter 6 Monaten
- Personen mit fieberhaften Krankheiten
- Schwangeren Frauen im 1. Trimenon (ersten drei Schwangerschaftsmonate)
- Personen, die allergisch auf Hühnereiweiss reagieren oder bei einer vorgängigen Impfung gegen saisonale Grippe starke allergische Reaktionen aufwiesen, sowie Personen, die Antigerinnungsmedikamente einnehmen, sollten die Situation mit ihrem Arzt besprechen.

Welche unerwünschten Wirkungen kann die Impfung haben?

- Die unerwünschten Wirkungen sind prinzipiell harmlos und dauern weniger als 3 Tage:
 - Reaktion an der Einstichstelle wie Schmerzen, Rötung und Schwellung.
 - Manchmal entzündliche Reaktion mit Fieber, Schüttelfrost, Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit.
- Sehr selten können einige Minuten bis Stunden nach der Impfung schwere allergische Reaktionen auftreten.

Impfdaten:

25. / 26. / 27. / 30. November 2009
01. / 02. / 03. / 04. Dezember 2009

17.00 – 20.00 Uhr
17.00 – 20.00 Uhr

**A3 Süd: Medizinisches Ambulatorium Haus A 3. Stock
Gelber Lift 3. Stock**

**Bitte vorher das persönliche
Impfdatenblatt ausfüllen und den
Impfausweis bereit halten**